
По сравнению с традиционной хирургической операцией баллонная синусопластика:

- менее травматична
 - позволяет сохранять естественную анатомию пазух и иных анатомических структур
 - снижает риск повреждения слизистой оболочки и сохраняет функционирование пазух
 - снижает риск послеоперационных осложнений
 - снижает кровопотери во время операции
 - восстановительный период в среднем 24 часа (обычная операция — 3-5 дней)
 - зачастую не требует общей анестезии (достаточно только местной)
-

Не надо больше ждать.
Узнайте как Баллонная Синусопластика может избавить Вас от симптомов синусита.

Процедура баллонной синусопластики предназначена не для всех пациентов. Для того, чтобы понять, подходит ли эта процедура для вас, обратитесь к вашему лечащему врачу.

СТРАДАЕТЕ ОТ
ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА?

Выход есть!



Баллонная
Синусопластика

О ХРОНИЧЕСКОМ СИНУСИТЕ



Околоносовые пазухи представляют собой воздушные камеры костей черепа, соединенные с полостью носа соустьями. Изнутри пазухи выстланы мерцательным эпителием с бокаловидными клетками, продуцирующими слизь. Посредством движения ресничек эпителия происходит движение слизи к соустьям. Все, что препятствует этому процессу, приводит к накоплению слизи в пазухах и последующему воспалению.

Синусит выражается в воспалении одной или нескольких придаточных пазух носа. Предрасполагающими факторами для возникновения этого заболевания могут являться врожденные или приобретенные нарушения анатомических структур полости носа, полипозные разрастания в воздушных ходах, аллергические риниты, бактериальная или вирусная инфекция. **Синусит** считают хроническим, если воспаление длится более 3 месяцев².

Общие симптомы синусита²:

- Боль в области лица, ощущение давления, наполненности или заложенности носа.
- Затрудненное носовое дыхание
- Выделение из носа слизи желтого или зеленого цвета
- Зубная боль
- Утрата обоняния и вкусовых ощущений
- Головная боль
- Повышенная утомляемость
- Боль в горле

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ БАЛЛОННУЮ СИНУСОПЛАСТИКУ?

Обычно лечение начинается с назначения препаратов лечащим врачом. Однако более чем 40 % пациентов, страдающих хроническим синуситом, не испытывают улучшения при медикаментозном лечении.³ В этом случае рекомендуется хирургическая операция.

Баллонная синусопластика — это малоинвазивная процедура, позволяющая открыть соустья околоносовых пазух. Она значительно снижает боль, давление и иные симптомы, присутствующие обычно при синуситах.

БЕЗОПАСНО

Более 200 000 пациентов¹ по всему миру прошли через безопасную процедуру баллонной синусопластики

ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТСЯ

По результатам опроса пациентов 95% из них согласились бы на повторную процедуру⁴

БЫСТРО

Время восстановления после операции варьируется от пациента к пациенту; большинство в кратчайшие сроки возвращается к нормальной привычной жизни⁵

В некоторых случаях баллонная синусопластика может выполняться амбулаторно под местной анестезией

¹ По данным Acclarent за 2011 год

² <http://www.entnet.org/healthinformation/sinusitis.cfm>


³ Hamilos, D. Chronic sinusitis. J Allergy Clin Immunol 2000; 106: 213–227; Stankiewicz, J., et al., Cost Analysis in the Diagnosis of Chronic Rhinosinusitis. Am J Rhinol 2003;17 (3): 139–142; Subramanian, H., et al. A Retrospective Analysis of Treatment Outcomes and Time to Relapse after Intensive Medical Treatment for Chronic Sinusitis. Am J Rhinol 2002; 16 (6): 303–312; Hessler, J., et al. Clinical outcomes of chronic rhinosinusitis in response to medical therapy: Results of a prospective study. Am J Rhinol 2007; 21 (1): 10–18; Lal, D., et al. Efficacy of targeted medical therapy in chronic rhinosinusitis, and predictors of failure. Am J Rhinol Allergy 23, 396–400, 2009.

⁴ ORIOS I, office-based dilation, Data on file at Acclarent.


⁵ Wynn R, Vaughn W. "Post-Operative Pain After FESS with Balloon Sinuplasty." AAO, 2006.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?


Во время баллонной синусопластики воспаленные пазухи открывают щадящим способом, сохраняющим целостность тканей и не повреждающим слизистую оболочку.




Шаг 1.
Баллонный катетер вводят в воспаленную пазуху



Шаг 2.
Баллон аккуратно раздувают, расширяя естественное соустье пазухи



Шаг 3.
Пазуху промывают от гноя и слизи с помощью различных растворов



Шаг 4.
Инструмент выводят из носовой полости

После Баллонной синусопластики пазухи остаются открытыми и могут нормально функционировать, отводя слизь. Вы больше не ощущаете давления в области лица и иных симптомов синусита.